

BERGERAC



BERGERAC "Il viola che ammalia"

Varietà dalla buccia viola intensa e dalla pasta viola. Una varietà francese ottenuta dall'incrocio di "Belle de Fontenay" e "Vitelotte". Un mix incredibile di tradizione, colore, stile e bontà. Tubero di forma ovale dalla buccia liscia e dalla pasta farinosa. La patata Bergerac si presta per la preparazione d'insoliti ed ottimi purè ma anche chips sottili e croccanti e patate fritte gustose e divertenti.

Maturazione : medio-precoce e resistente alle malattie ed alla siccità.

Resa indicativa : 400/Kg per 100 mq

Semina: Le varietà da noi selezionate sono certificate. È importante comunque effettuare una rotazione di 4 anni e non piantare in un terreno dove prima era stata coltivata un'altra solanacea, né farla seguire da altre solanacee. Una rotazione potrebbe essere: patate, leguminose, brassicacee, altre verdure. In solchi profondi 10 cm. s'interrano i tuberi interi o tagliati a metà, se piuttosto grossi, a fine inverno-inizio primavera. In Italia meridionale si può anticipare a metà inverno.


Distanze: Le varietà precoci si distanziano 60-70 cm. tra le file e 30 cm. sulla fila. Le tardive 70-80 cm. tra le file e 40 cm sulla fila.

Consigli: I terreni migliori sono sciolti, freschi, profondi, concimati (ottimo FERTOFIT orto e frutta). Quando il germoglio è alto 5-10 cm, eliminare le infestanti e rincalzare il terreno per una altezza di 30-35 cm. per evitare l'inverdimento dei tuberi. A completa maturazione gambi e foglie iniziano a ingiallire. All'occorrenza si effettuano trattamenti con insetticidi specifici a bassa tossicità.

Seme occorrente: 20- 25 kg di tuberi per 100 mq di terreno. In condizioni ottimali la raccolta si esegue da maggio a settembre. Il raccolto può variare da 300 a 400 kg. per 100 mq.



Bergerac



High content of anti oxidant, Top cuisine quality, Suitable for crisps.


Parentage: Vittelote Noir X BH 98-180

General description

Market segment	Vittelote Noir, Purple Star
Maturity	Middle late
Foliage	Good
Skin color	Purple
Flesh color	Purple
Tuber shape	Long
Eye depth	Shallow eyes
Tuber size	Small tubers
Yield	High
Dry matter contents	22%

Resistance

Resistance to leaf-roll virus	7
Resistance to A-virus	7
Resistance to X-virus	7
Resistance to Y-virus	6
Resistance to Phytophthora (leaf)	5
Resistance to Phytophthora (tuber)	6
Resistance to internal bruising	Normal
Wart disease Fysio 1	Resistant
Resistance to Common Scab	8



Growing instructions BERGERAC

General remarks

Bergerac is a special, high yielding potato variety. The tubers have a long shape and small size. Skin and flesh colors are Purple. Cooking type B. The dry matter content is average, about 21,5%.

Maturity

Middle late

Seed treatment

When the tuber dormancy has broken, Bergerac will have good and strong sprouts. Bergerac can be planted directly from storage.

Cultivation

Bergerac has a high number of tubers per plant. The planting distance in the row is depending on the needs of the market. In general for the size 32/40 +/- 40.000 tubers /ha. For small size pre-packing the planting density should be higher. Bergerac is light sensitive to Sencor.

Fertilisation

The Bergerac needs more nitrogen (+/- 50 kg N) as Spunta, a split application is recommended.

Harvest

Due to his small tubers it is important to harvest and handle with great care to avoid damage. Bergerac is moderate sensitive to mechanical damage.

Storage

This variety can be stored for long periods in cold stores. However, once dormancy is broken, the development of sprout growth is rapid.

Resistance to diseases

Bergerac is resistant to:

- Wart disease (Fysio, 1).
- Blight : slight sensitive to foliage blight, susceptible to tuber blight.
- Common scab; Good resistance.
- Virus : normal resistance to Leaf roll virus and a reasonable resistance to PVY.